

イノラス配合経腸用液Q & A

イノラス配合経腸用液（以下、イノラス）につきまして、患者さん・ご家族から寄せられるご質問と回答をまとめました。

- | | |
|---|-------------------|
| 1 | 温めてもよいですか？ |
| 2 | 水分量はどのくらいですか？ |
| 3 | 水を混ぜてもよいですか？ |
| 4 | 食塩を混ぜてもよいですか？ |
| 5 | 開封後、どのくらい保存できますか？ |
| 6 | 乳糖不耐症ですが使用できますか？ |
| 7 | 下痢をすることはありますか？ |
| 8 | 使用量を変えてもよいですか？ |
| 9 | 医療機関以外で購入できますか？ |

1 温めてもよいですか？

温めて使用することは可能です。
容器を未開封のままお湯につけて、37～40℃程度になるようにしてください。

(注意)

湯せんは高温を避け
70℃以下で加温して
ください。




70℃
以下

やむをえず電子レンジで加温する場合には、1回量の栄養剤を別容器に移し替えて、37～40℃程度になるようにしてください。

(注意)

容器のまま電子レンジで加温すると発火
や容器破損のおそれ
があります。



2 水分量はどのくらいですか？

125mL中、約93mLです。

187.5mL中、約140mLです。

3 水を混ぜてもよいですか？


水を混ぜることは可能です。

微生物汚染防止のため、一度煮沸した湯冷ましの使用をおすすめします。




4 食塩を混ぜてもよいですか？

食塩を混ぜると、性状が変化するおそれがありますので、原則、混合は避けてください。



5 開封後、どのくらい保存できますか？

開封後はすぐに使用してください。
やむをえず保存する場合は、冷蔵庫に
保存し24時間以内に使い切ってください。



6 乳糖不耐症ですが使用できますか？

イノラスには、乳糖が含まれています。
使用できるかどうかは、かかりつけの医
療機関へご相談ください。

7 下痢をすることはありますか？

イノラスを使用すると、軟便やドロドロした便になるなど、トイレに行く回数が増えることもあります。このような場合には水分補給を行い、かかりつけの医療機関へご相談ください。

【注意】

上記以外でも気になる症状が出た場合は、かかりつけの医療機関へご相談ください。

8 使用量を変えてもよいですか？

使用量は医師が診断し、患者さんの状態に合わせて調整されます。使用量の変更を希望される場合には、かかりつけの医療機関へご相談ください。

9 医療機関以外で購入できますか？

通信販売やスーパー、あるいはコンビニエンスストア等で購入することはできません。イノラスは、原則として医師が診断した上で発行する処方箋に基づいて患者さんへお渡しするものです。

